



Алгоритм действий при сердечном приступе



При появлении давящих, сжимающих, жгущих, щемящих, ломящих, неопределенных, но явных (кроме колющих, режущих, постоянно монотонноющих, усиливающихся при дыхании) болей/ощущение в области груди, левого плеча, лопатки, обоих плеч действуйте, как указано на схеме.

Если аспирин или нитроглицерин недоступны, а боли сохраняются более 5 минут - **срочно вызывайте скорую помощь (112 или 03).**

БУ «Центр медицинской профилактики»
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 34
Web-сайт: www.cmphmao.ru
Тел.: +7 (3467) 318-466
2019 год

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ

1.



АСПИРИН 0,25 Г
РАЗЖЕВАТЬ И ПРОГЛОТИТЬ

2.



НИТРОГЛИЦЕРИН 0,5 Г
ПОД ЯЗЫК (капсулу раскусить, не глотать)

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОКОЙ И
ДОСТУП СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

через 5 минут

ОБРАТИТЬСЯ
К ВРАЧУ

← БОЛИ
ИСЧЕЗЛИ

БОЛИ
СОХРАНЯЮТСЯ

3.



НИТРОГЛИЦЕРИН 0,5 Г
ПОД ЯЗЫК, НЕ ГЛОТАТЬ

СРОЧНО ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ – 112

через 10 минут

БОЛИ СОХРАНЯЮТСЯ

4.



НИТРОГЛИЦЕРИН 0,5 Г
ПОД ЯЗЫК, НЕ ГЛОТАТЬ