




Продолжительность боли
более 15 минут

При наличии этих признаков
необходимо срочно вызвать
«скорую помощь»!



Помните! Время, за которое можно успеть восстановить кровоток в артерии сердца и остановить гибель клеток сердечной мышцы – «терапевтическое окно» – **6 часов** от начала появления симптомов.

Чем раньше Вы вызовете бригаду «скорой помощи», тем более эффективным будет лечение и меньше осложнений инфаркта.




Инфаркт миокарда

БУ «Центр медицинской профилактики»
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 34.
Web-сайт: www.cmphmao.ru. Тел.: +7 (3467) 318-466
2019 год

Инфаркт миокарда – это гибель клеток сердечной мышцы вследствие нарушения их кровоснабжения. Погибшие клетки сердца замещаются рубцовой тканью, которая неспособна к сокращению. Это значительно ухудшает работу сердца.




Как правило, инфаркт миокарда развивается на фоне затянувшегося приступа стенокардии.



Признаки инфаркта миокарда:

- ✓ интенсивная сжимающая/давящая боль за грудиной (кинжальная, раздирающая, жгучая, «кол в грудной клетке»);
- ✓ боль может отдавать в руку, шею, спину, челюсть слева или область лопаток;




- ✓ боль не проходит после приема нитроглицерина и длится более 15 минут;
- ✓ боль может сопровождаться резкой слабостью, бледностью кожных покровов, обильным холодным потом, чувством страха, учащением пульса, резкими колебаниями артериального давления (давление может быть как повышенным, так и пониженным).

Примечание:

- ✓ иногда человек может жаловаться только на дискомфорт за грудиной, одышку и боль в левой руке;
- ✓ нередко инфаркт миокарда протекает безболезненно, что характерно для больных сахарным диабетом, так как у «диабетиков» снижен болевой порог.

Запомните главные признаки инфаркта миокарда!



Интенсивная боль



Боль не прекращается после приема нитроглицерина